BULLETIN

DE LA

SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE DE FRANCE

Séance du 10 avril 1907.

Présidence de M. P. LESNE,

M. le Dr J. Manon (de Montargis) assiste à la séance.

Nécrologie. — Le Président annonce avec regrets le décès de M. E. Postelle, notre collègue depuis 1903.

— M. J. Magnin annonce que notre ancien collègue, le baron Achille Bonnaire, est décédé à La Flotte (île de Ré), le 22 février dernier, dans sa 84e année. M. A. Bonnaire fit partie de notre Société de 1860 à 1890. Sa collection de Coléoptères paléarctiques, très intéressante et riche en *types*, est devenue, depuis deux ans, la propriété de M. J. Magnin, qui la tient à la disposition des entomologistes désireux de la consulter.

Correspondance. — M. H. Tondu remercie la Société de son admission.

— MM. le Dr M. Bailliot, L. Dupont et J. Guerry se sont fait inscrire pour le Congrès.

— Le Président donne lecture d'une lettre par laquelle M. le maire de Brives (Corrèze) l'informe de la constitution d'un comité ayant pour but d'élever un monument commémoratif en l'honneur de P. A. Latreille, l'illustre savant qui, le premier, a appliqué les règles de la méthode naturelle à la classification des Insectes et qui fut le fondateur de la Société entomologique de France.

M. le maire de Brives, président du Comité Latreille, invite le Président de la Société entomologique de France à la cérémonie d'inauguration qui aura lieu le 16 juin prochain. Il demande en outre à la Société de participer d'une façon effective à la souscription ouverte en vue de couvrir les frais de l'érection du monument. Cette question est renvoyée à l'examen du Conseil.

Distinctions honorifiques. — Le Président annonce que, à l'oc

casion du Congrès des Sociétés savantes, tenu à Montpellier, MM. L. Bedel et G. Buchet viennent d'être promus officiers d'Instruction publique et MM. P. Klincksieck, H. d'Orbigny et R. Martin nommés officiers d'Académie.

— M. Maurice Maindron a été nommé membre correspondant des Antiquaires de France et vice-président de la Société d'Histoire du Costume.

Exonération. — M. E. Le Moult s'est fait inscrire comme membre à vie.

Changement d'adresse. — M. H. Tondu, administrateur de commune mixte, sous-préfecture de Tlemcen, département d'Oran (Algérie).

Présentations. — M. Gaston Lasègue, 118, quai Jemmapes, Paris, 10e. *Entomologie générale, principalement Coléoptères et Lépidoptères.* — Présenté par M. P. Lesne et admis séance tenante en qualité de membre assistant.

— M. Marc Rondeau du Noyer, préparateur de Zoologie à l'École de Pharmacie, 14, rue Crozatier, Paris, 12e, présenté par M. P. Lesne. — Commissaires-rapporteurs : MM. Maurice Royer et J. Surcouf.

Démission. — M. Derancourt envoie sa démission.

Communications.

Description d'une nouvelle espèce de *Morostoma* Cand. [Col.]

par Ed. Fleutiaux.

Morostoma subdepressum, nov. sp. — Long. : 20 mill. — Allongé, peu convexe, d'un brun foncé brillant. Tête rugueusement ponctuée. Palpes ferrugineux, un peu plus courts que les antennes. Antennes ferrugineuses, n'atteignant pas la base du thorax. Pronotum plus long que large, sinué latéralement, ponctué plus fortement en avant; angles postérieurs longs et divergents. Écusson plan, oblong. Élytres longs, plus larges que le pronotum, parallèles, rétrécis seulement dans le quart postérieur, ponctués-striés; intervalles plans. Dessous plus clair. Hanches postérieures graduellement rétrécies en dehors. Pattes ferrugineuses, assez longues, minces; tarses plus longs que les tibias.

Ambositra (Madagascar).

Diffère de *M. palpale* Cand., par la taille plus grande, la forme moins convexe, la couleur plus claire et plus brillante, les palpes moins longs, le pronotum proportionnellement plus étroit, moins fortement ponctué, plus sinueux sur les côtés; les élytres plus longs, moins profondément ponctués-striés. Dessous plus clair. Antennes et palpes ferrugineux comme les pattes.

***

Nota. — La faune de Madagascar offre certaines formes très curieuses d'*Elateridae* parmi lesquelles le *Diplophœnicus Alluaudi* Cand., dont la femelle est peut-être le *Paradaxon antennale* Fleut.

Si ma supposition se vérifie, en se trouvera en présence d'un cas remarquable de dimorphisme, analogue à celui du genre *Pachyelater*, signalé par M. Lesne.

Diagnoses de deux *Ancyrona* nouvelles de l'Inde [Col.]

par A. Léveillé.

Ancyrona Andrewesi, nov. sp. — *Oblonga, deplanata, nitida, ferrugineo-brunnea, setosa, lateribus ciliatis; capite sat dense et fortiter punctato; prothorace transversissimo, antice angustato, modice emarginato, sat fortiter, disco minus dense, punctato, lateribus arcuatis, haud vel vix crenulatis, angulis anticis parum productis, retusis, posticis subrotundatis, linea basali marginata; scutello subtriangulari, apice retuso, punctato; elytris pone medium vix ampliatis, striato-punctatis, intervallis subelevatis, uniseriatim punctulatis. Subtus, antennis pedibusque dilutioribus, segmentis ventralibus fere impunctatis.* — Long. : 5 mill.; lat. : 2,5 mill.

Nilghiri Hills. — Coll. Andrewes, A. Grouvelle, la mienne; 6 exemplaires.

A. indica, nov. sp. — *Oblonga, subdepressa, nitida, brunnea, setosa, lateribus ciliatis; capite sat dense et fortiter punctato; prothorace fortiter transverso, subconvexo, antice angustato, modice emarginato, sat fortiter punctato, lateribus subarcuatis, subfoliaceis, haud crenulatis, angulis anticis parum productis, retusis posticis subrotundatis, linea basali marginata; scutello subtriangulari, apice retuso; elytris pone medium vix ampliatis, striato-punctatis, intervallis uniseriatim punctulatis. Corpore subtus, antennis pedibusque dilutio-*

ribus, segmentis ventralibus sparse punctatis. — Long. : 3-3,5 mill.; lat. : 1,5 mill.

Nilghiri Hills. — Coll. Andrewes, A. Grouvelle, la mienne; 5 exemplaires.

Contributions à la faune française [Col.]

par A. Méquignon.

A la fin d'avril 1905, mon ami R. Peschet et moi prîmes dans le Morvan, à Arleuf (Nièvre), une vingtaine d'individus d'un *Hydraena* que notre savant collègue, J. Sainte-Claire Deville reconnut immédiatement comme nouveau. Mais les mâles seuls pouvant se distinguer nettement de ceux de certaines races du protéique *H. nigrita* Germ., il ne jugea pas à propos d'en publier une description isolée.

Or cet insecte vient d'être décrit comme espèce distincte par M. Norman H. Joy, sous le nom d'*H. Britteni*, dans le numéro d'avril de *The Entomologist's Monthly Magazine*, t. XLIII, [1906] pp. 79-81, et notre ami Sainte-Claire Deville, qui, d'après la description et les figures, avait reconnu dans l'*H. Britteni* du nord de l'Angleterre et de l'Irlande l'insecte du Morvan, a reçu de M. Joy confirmation expresse de cette identité.

H. Britteni Joy se distingue de ses voisines, *H. nigrita* Germ., *H. morio* Kies., *H. riparia* Kug., par le dernier article des palpes maxillaires du mâle, qui affecte la forme d'un yatagan, ainsi que l'a figuré le descripteur. La constance de ce caractère singulier chez des individus provenant de régions si diverses, semble confirmer sa valeur spécifique.

Nos exemplaires ont été trouvés dans les *Sphagnum* d'une source située vers 800^{m} d'altitude. Cette espèce semble printanière : abondante à la fin d'avril, elle avait presque disparu vers la mi-juillet. Capturée dans la région des sources de l'Yonne, l'*H. Britteni* Joy fait donc partie, non seulement de la faune française, mais encore de celle du bassin de la Seine.

Cette même région du Morvan m'a fourni deux autres espèces qui sont vraisemblablement nouvelles pour cette dernière faune : *Othius melanocephalus* Grav., insecte subalpin dont j'ai trouvé un seul individu à Brassy, sous une pierre, vers 400^{m} d'altitude, et *Latelmis opaca* Müll., assez abondant dans le gravier des ruisseaux à Brassy et à Arleuf.

Latelmis opaca se trouve également dans la Haute-Marne : Roches-sur-Rognon (Sainte-Claire Deville). Quant à l'*Othius melanocephalus* Grav., il a déjà été signalé de Rouvray, par Emy, ap. Rouget. Cat. Côte-d'Or, p. 395; mais l'*O. myrmecophilus* Kies., qui a précisément pour synonyme *O. melanocephalus* Mann., bien que commun partout, ne figure pas dans ce catalogue, et ce doit être lui que Rouget a indiqué par erreur sous le nom de *melanocephalus* Grav. (1).

Aux espèces du Morvan déjà signalées ici-même (2), de nouvelles chasses, faites tant par mes amis J. Sainte-Claire Deville et R. Peschet, que par moi-même, me permettent d'ajouter les suivantes :

Pterostichus (*Haptoderus*) *pumilio* Dej. — Très abondant à Arleuf.

Stenus fossulatus Er. — En nombre sur les parties encore un peu fraîches des talus ombragés, juillet (Sainte-Claire Deville).

Xantholinus distans Rey, *Euryporus picipes* Payk., *Mycetoporus rufescens* Steph., *Lamprinodes saginatus* Grav. — Arleuf, dans les mousses, avril.

Gyrophaena (*Agaricochara*) *laevicollis* Kr. — Brassy, septembre.

Atheta (*Microdota*) *atomaria* Kr. — Forêt de Saint-Prix, écorces de Hêtre, avril.

Bythinus validus Aubé. — Arleuf, dans des mousses, avril.

Euplectus Fischeri Aubé. — Arleuf, écorces de Hêtre (Sainte-Claire-Deville).

Platysoma frontale Payk. — Arleuf, écorces de Hêtre (Peschet!)

Helophorus arvernicus Muls. — Brassy, un individu.

Rhizophagus nitidulus Fabr. — Forêt de Saint-Prix, écorces de Hêtres morts sur pied.

Mycetophagus atomarius Fabr., *Cerylon fagi* Ch. Bris. — Arleuf, écorces de Hêtre (Sainte-Claire Deville).

Limnius troglodytes Gyll., *Esolus pygmaeus* Müll. — Brassy, dans le gravier des ruisseaux, le premier très abondant.

Dupophilus brevis Muls., *Helmis fossulata* Kuw. — Arleuf, aussi communs qu'à Brassy.

(1) Cf. Fauvel, Faune gallo-rhénane III, p. 370 et Suppl. p. 69.

(2) *Bull. Soc. ent. Fr.* [1902] p. 238 et [1903] p. 340. Cf. aussi Sainte-Claire Deville in *L'Abeille*, t. XXX, p. 262 et 264.

Latelmis Perrisi Dufour (*Germari* Er.). — Forêt de Saint-Prix (Peschet!)

Tetratoma ancora Fabr. — Forêt de Saint-Prix, écorces de Hêtre.

Leptura aurulenta Fabr. — Brassy, 1 ♀ sur un Merisier, juillet.

Cryptocephalus punctiger Payk., *C. decemmaculatus* L. var. *bothnicus* L. — Arleuf, sur *Salix aurita*, juillet (Sainte-Claire Deville).

C. decemmaculatus L. et var. *bothnicus* L. — Brassy.

C. labiatus L. var. *digrammus* Suffr. — Brassy, plusieurs individus avec le type, juillet-août.

Dorytomus salicinus Gyll., *D. salicis* Walton. — Arleuf, en nombre sur *Salix aurita*, juillet (Sainte-Claire Deville).

Nouveaux Coléoptères du Nord-Africain

(quatrième note) (1)

par P. de Peyerimhoff.

8. **Apteranillus Pueli**, nov. sp. — Apt. Dohrni *Fairm. simillimus, prothorace convexo, ultimisque abdominis segmentis laeviusculis statim discernendus. Caput subtriangulare, rotundatum, in disco deplanatum, fere impunctatum, nitidulum. Pronotum latitudine sua circiter triente longius, antice ampliatum, convexiusculum, profundissime canaliculatum, utrinque versus basim leviter impressum, margine laterali desuper visabunda, angulis posticis indicatis. Abdominis quatuor priora segmenta dense punctulata, ceteris laevatis.* — Long. : 4,5 mill.

Bou Berak (Puel in coll. Peyerimhoff), un exemplaire probablement mâle.

Extrêmement voisin de *Dohrni* Fairm. (de Tanger et Gibraltar), dont il a la taille et le faciès, mais distinct par la tête beaucoup moins rétrécie en avant, le prothorax convexe, plus allongé, et les derniers segments de l'abdomen presque lisses ; diffère de *Lethierryi* Fauvel par le prothorax bien plus long, à rebord latéral visible d'en haut, et à angles postérieurs marqués.

(1) Première note in *Bull. Soc. ent. Fr.*, 1905, p. 229. — Deuxième note, *ibid.*, 1906, p. 37. — Troisième note, *ibid.*, p. 55.

9. **Euconnus (Tetramelus) caeculus**, nov. sp. — *Totus ferrugineo-rufus, laevis, pilis subincumbentibus sparsim hirtus. Caput aeque longum ac latum, postice attenuatum, pronoto valde angustius, caecum. Antennae tenues, art. 1-2 aequis, longioribus quam latioribus, 3-7 aeque longis ac latis, 8-9 valde majoribus, leviter transversis, cum 11° clavam distinctissimam efformantibus. Prothorax aeque longus ac latus, antice attenuatus, a medio ad basim parallelus, carina destitutus, postice quadrifovealatus. Coleoptera breviter ovalia, turgida, laevata, utrinque fovea humerali notata.* — Long. : 1,20 mill.

Bou Berak (Puel in coll. Peyerimhoff), deux exemplaires.

Cette espèce, qui vient représenter en Algérie le sous-genre *Tetramelus* des *Euconnus* (1), jusqu'à présent étranger à cette faune, est des plus remarquables par sa cécité complète, son arrière corps ventru, et la massue antennaire de 4 articles, extrêmement détachée ; ce dernier caractère la range dans le groupe *Euconnoides* Croiss., où d'ailleurs elle n'a point d'analogue.

10. **Liodes (Oosphaerula) pseudocolenis**, nov. sp. — *Breviter ovata, valde convexa, nitidissima, brunneo-rufa, coleopteris in disco paulum infuscatis, pilis subtilibus flavis ad latera praesertim sparsa. Caput subtilissime punctulatum, punctis quaternis consuetis ad frontem instructum. Antennarum gracilium articulus tertius secundo paullo lon-*

(1) Tableau des *Euconnus* du Nord de l'Afrique :

1. Élytres pourvus d'un pli huméral (*Euconnus* Thomson). Des yeux..... 2.
— Élytres sans pli huméral (*Tetramelus* Motsch.). Pas d'yeux... ..... *E. caeculus* Peyer.
2. Massue antennaire de 4 articles..... 3.
— Massue antennaire de 3 articles..... 4.
3. 7e article des antennes à peine plus long que large. Élytres en ovale allongé. Insectes d'un brun clair..... ..... *E. promptus* Coq., *spissicornis* Coq.
— 7e article des antennes beaucoup plus long que large. Élytres courts. Insecte d'un brun foncé..... *E. nebulosus* Reitt.
4. Articles 3-7 des antennes transverses. Insecte de 1,1 mill..... ..... *E. intrusus* Schaum.
— Articles 3-7 des antennes plus longs que larges. Insecte de 0,8 mill. ..... *E. africanus* Croiss.

Ainsi que je m'en suis assuré au Muséum de Paris, c'est cette dernière espèce que Lucas a mentionnée sous le nom de *nanus* dans l'*Exploration scientifique de l'Algérie*.

gior, clava concolor, definita, articulo ultimo angustiore. Pronotum a basi ad apicem gradatim attenuatum, angulis posticis fere rectis, ut caput subtilissime punctulatum, basi punctis sparsissimis majoribus transversum redactis instructa. Scutellum subtilissime punctulatum. Coleoptera leviter striato-punctata, striis apicem versus evanidis, intervallis planissime transversum striolatis, haud punctatis. Mesosternum elatum, antice autem haud abrupte decline. Metasternum in area laevi postice bituberculata deplanatum. Pedes breves, tibiis sumptis incurvatis, latis, femoribus posticis ad apicem obtuse dentatis. — Long. : 1,8-2,2 mill.

Signa maris : *Tarsi primi, praesertim autem secundi paris incrassati, femora postica acutissime dentata. Area mesosterni tomentosa.*

Bou Berak, ♂♀ (Puel in coll. Peyerimhoff). Massif des Mouzaïa, ♀.! L'Edough, ♀ (Bedel!).

Par son mésosternum fortement caréné, cette espèce, qui a l'aspect d'un grand *Colenis*, se range indubitablement parmi les *Oosphaerula* Ganglb. Elle s'éloigne de toutes ses congénères, en particulier de *L.* (*Oosphaerula*) *badia* Sturm, déjà rencontré dans le Nord de l'Afrique, par les strioles transversales très marquées, remplaçant exclusivement la ponctuation sur les intervalles des élytres. Les caractères sexuels secondaires de cet insecte sont également très particuliers.

Je ne saurais assez remercier M. L. Puel de la générosité avec laquelle il m'a offert ces trois espèces si remarquables du Nord de l'Afrique.

Description d'une nouvelle aberration de *Daimio sinica* Feld. [Lép. Rhopal.]

par Ch. Oberthür.

J'ai déjà fait connaître (*Étud. Entom.*, livr. xx, pl. 6, fig. 95) sous le nom de *refulgens*, une superbe aberration de *Celaenorrhinus maculosa* Feld., prise à Siao-Loû, dans la région sino-thibétaine de Tâ-tsien-Loû, par les chasseurs indigènes du P. Déjean. Dans cette aberration *refulgens*, toutes les taches vitreuses des ailes supérieures confluent en une énorme tache, absolument comme chez l'ab. *Taras* de *Syrichthus malvae*.

Ayant reçu tout dernièrement les papillons résultant des chasses faites pour moi, sur la frontière du Thibet, pendant l'année 1906, j'ai

trouvé parmi les *Daimio sinica* Felder, une aberration absolument analogue à la *refulgens* de *maculosa* et à la *Taras* de *malvae*. Aux ailes supérieures de cet exemplaire aberrant que j'appelle **Epitaras**, var. nov. toutes les taches blanches vitreuses se trouvent réunies en une seule macule occupant tout le disque, divisée par le trait noir fin des nervures et centralement marquée par le trait noir de la cellule discoïdale. Les ailes inférieures sont noires; la frange elle-même est noircie et seul le point terminal des nervures est marqué de blanc; au centre, le trait cellulaire est blanc et quelque faible partie des nervures y est marquée de blanc; de telle façon que le mode d'aberration sur les ailes inférieures paraît être l'inverse de la variation des supérieures.

Le dessous, pour les supérieures, reproduit le dessus; mais, aux ailes inférieures, la base reste teintée de gris-bleuâtre; les nervures et le trait qui clôt la cellule, restent blancs; les points noirs sont élargis et confluents.

La *D. sinica* est une espèce commune dans la région sino-thibétaine. Elle varie un peu et j'ai rangé dans ma collection une série de 120 exemplaires de diverses localités du Su-tchuen et présentant quelques modifications comparatives, notamment pour la taille, le nombre et la forme des taches blanches vitreuses aux ailes supérieures en dessus, la largeur de la bande blanche aux ailes inférieures, l'accentuation des cinq points noirs, le long du bord externe de cette bande blanche, la confluence des points noirs en dessous. Mais je n'avais encore jamais vu d'exemplaire se rapprochant de l'ab. *Epitaras*.

Je pense que *D. Thetys* Ménétr., de Japon et Mandchourie, est une forme de *sinica*, à ailes inférieures sans bande transversale blanche. *Thetys* paraît également être commune dans les lieux qu'elle habite.

Leech (Butterfl. from Japan, etc.) observe (p. 565) qu'une aberration de *Thetys* semblable à l'*Epitaras* de *sinica*, existait dans la collection Pryer : « In Pryer's collection there is an extraordinary aberration, in which all the spots on primaries are united, forming an irregular V-shaped patch, interrupted by the nervures, and a bar at the extremity of the cell. »

L'aberration *Epitaras* se retrouve donc chez *Thetys*, de même que chez *sinica*, et comme, ainsi que je l'ai constaté ci-dessus, elle est analogue à *Taras* et à *refulgens*, elle confirme une des lois de variation qui atteignent sans doute toutes les *Hesperies*, susceptibles, par la disposition de leurs taches, d'y être soumises.

Bulletin bibliographique.

Austen (E.-E.) : Illustrations of British Blood-Sucking Flies ; Londres, 1906, 74 p., 34 p. col.

Chevreux (E.) : *Orchomenella lobata*, nouvelle espèce d'Amphipode des régions arctiques; (*Bull. Inst. Océan.*) 1907, 6 p., fig.

Grouvelle (A.) : Clavicornes nouveaux du Musée civique; (*Ann. Mus. civ. St. nat. Gen.*) 1906, 26 p.*

Id. : Nitidulides nouveaux du British Museum, 2 notes; (*Bull. Soc. ent. Fr.*) 1906, 5 p.*

Id. : Voyage de M. C. Alluaud dans l'Afrique Orientale (juin 1903 à mai 1904), Dryopidae, Helminthidae, Heteroceridae; (*loc. cit.*) 1906, 16 p., 1 pl.*

Id. : Contribution à l'étude des Coléoptères de Madagascar; (*loc. cit.*) 1906, 102 p., 2 pl. n.*

Hampson (G.) : Catalogue of the Lepidoptera Phalenae in the British Museum, VI; Londres 1906, 532 p., fig., 12 pl. col.

Kirby (W.-F.) : A Synonymic Catalogue of Orthoptera, II : Orthoptera saltatoria, part. I (Achetidae et Phasgonuridae); Londres 1906, 562 p.

Surcouf (J.) : Description de trois Diptères nouveaux du genre *Tabanus*, de la zone tropicale de l'Afrique; (*Bull. Mus. Hist. nat.*) 1907, 3 p.*

Id. : Notes sur les *Tabanus* rapportés de l'Afrique tropicale par M. le Dr Brumpt; (*loc. cit.*) 1907, 3 p.*

Id. : Nouveaux Diptères africains du genre *Tabanus*; (*loc. cit.*) 1906, 3 p.*

Id. : Diptères nouveaux du g. *Tabanus* rapportés du Fouta-Djalon par M. Chevalier; (*loc. cit.*) 1906, 2 p.*

Id. : Insectes Diptères nouveaux du g. *Tabanus* recueillis dans l'Est africain par M. M. de Rothschild; (*loc. cit.*) 1906, 3 p.*

Académie des Sciences (*C. R. hebdom. des Séances*), 1907, II, 11-13. — E. Roubaud : Branchies rectales chez les larves de *Simulium damnosum* Theob. Adaptation d'une larve de Simulie à la vie dans les ruisseaux de l'Afrique équatoriale.

Académie des Sciences de Cracovie (*Bulletin international*), 1906, 4-10. — V. Kulczynski : Fragmenta arachnologica, IV.

Annals and Magazine of natural History (*The*), 112, avril 1907. — W.-L. Distant : Rhynchotal Notes, XLI. — W.-T. Calman : On a Freshwater Decapod Crustacean collected by W.-L. Burchell at Para in 1829. (fig.). — H. Druce : Descriptions of new Species of Heterocera belonging to the Families Syntomidae, Hypsidae, Cyllopodidae, Dioptidae and Erateininae. — G. Lewis : On a new Species of Histeridae and Notices of others. (fig.). — A.-S. Hirst : On a new Species of *Karschia* from Tibet, (fig.). — E.-E. Austen : The Synonymy and generic Position of certain Species of Muscidae (sens. lat.) in the Collection of the British Museum, described by the late Francis Walker. — G.-J. Arrow : Some new Species and Genera of Lamellicorn Coleoptera from the Indian Empire.

Entomologist's monthly Magazine (*The*), avril 1907. — F.-D. Morice : Help-Notes towards the Determination of British Tenthredinidae, etc. (18). — N.-H. Joy : *Hydraena britteni*, sp. nov., a new British beetle. (fig.). — J.-J. Walker : Some Notes on the Lepidoptera of the « Dale Collection » of British Insects, now in the Oxford University Museum. — Notes diverses.

Feuille des Jeunes Naturalistes (*La*), XXXVII, 437 et 438, 1907. — C. Cépède : Entretien sur les Sporozoaires, parasites des Insectes. — G. Goury et J. Guignon : Les Insectes parasites des Crucifères. — J. de Gaulle : Catalogue des Hyménoptères de France. — Notes spéciales et locales. — G. Goury et J. Guignon : Les Insectes parasites des Crucifères. — J. de Gaulle : Catalogue des Hyménoptères de France. — Notes spéciales et locales.

Geological Survey of Canada (*Reports*), 1906. — ⊙

Instructor (*El*), XXIII, 9-10, 1907. ⊙

Katalog Literatury naukowej Polskiej, IV, 1-2, 1906.

K. K. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien (*Verhandlungen*), LVI, 10, 1906, LVII, 1, 1907. — J. Müller : Cerambycidae Dalmatiae. — Dr. K.-A. Penecke et Dr. J. Muller : Koleopterologische Ergebnisse einer Sammelreise nach Dalmatien im Sommer 1905. — K. v. Hormuzaki : Die Schmetterlinge (Lepidoptera) der Bukowina, III.

Naturalista Siciliano (*Il*), 1907, 6-7. — A. Fiori : Alcani appunti sugli *Aphodius* L. d'Italia. — F. Vitale : Noterelle di Coleottero-

logia Sicula. — G. Coniglio Fanales : Primo contributo alla conoscenza della Fauna entomologica di Caltagirone. — G. Leoni : Revisione critica delle Specie del gen. *Pygidia* Muls. — F. Vitale : Osservazioni su alcune Specie di Rincofori Messinesi, IV.

Naturaliste (*Le*), 480, 1er mars et 1er avril 1907. — F. Meunier : Contribution à la faune des Mycetophilides du Copal récent de Zanzibar et de Madagascar (fig.). — Cap. Xambeu : Nidification des Euménides. — E. Trouessart : La distribution géographique des animaux vivants et fossiles. — Dr Bougon : Introduction des premiers vers à soie en Europe. — Dr E. Trouessart : La distribution géographique des animaux vivants et fossiles. — P. Noël : Le *Valgus hemipterus*.

New-York State Museum (*Memoir*), 8, 1906. — E.-P. Felt : Insects affecting Park and Woodland Trees, fig., 52 pl.

Novitates zoologicae, XIV, 1, 1907. — W. Rothschild et K. Jordan : New Sphingidae. — W. Rothschild : *Troides Alexandrae,* sp. nov. — W. Warren : New Drepanulidae, Thyrididae, Uraniidae and Geometridae from British New Guinea. — American Thyrididae, Uraniidae and Geometridae in the Tring Museum. — G. Hampson : Two new Indian Sphingidae. — New Zygaenidae in the British Museum. — N.-C. Rothschild : Some new Siphonaptera.

R. Accademia dei Lincei (*Atti*), 1907, I, 3-6. ⊙

Redia, III, 2, 1905. — A. Berlese : Sopra una anomalia negli organi sessuali esterni femminei di *Locusta viridissima*, (fig.). — F. Silvestri : Descrizione di un nuovo genere di Rhipiphoridae, (1 pl.). — Noti sui « Machilidae », (fig.). — Contribuzione alla conoscenza dei Termitidi e Termitofili dell' Eritrea, (fig.). — G. del Guercio : Intorno a tre specie rare di Microzilini italiani e alle diverse galle prodotte da varii Afidi sul *Populus nigra,* (fig.). — A. Berlese : Probabile metodo di lotta efficace contro la *Ceratitis capitata* Wied. e *Rhagoletis cerasi* L. ed altre Tripetidi. — L.-O. Howard : On the parasites of *Diaspis pentagona*, (fig.). — A. Berlese et G. Paoli : Serie maschile della *Pollonia pollonii* Costa, (fig.). — A. Berlese et F. Silvestri : Descrizione di un nuovo genere e di una nuova specie di Lecanite vivente sull' Olivo, (fig.).

Revista agronomica, V, 1, 1907. ⊙

Revue scientifique du Bourbonnais et du Centre de la France, XX, 1, 1907. — E. Olivier : Notes entomologiques.

Rivista Coleotterologica Italiana, V, 3, 1907. — G. Leoni : Gli *Sphodrus* italiani. — A. Porta : Recensioni.

Royal Society (*Proceedings*), B, 79, 527-529, 1907. ⊙

Sociedad Aragonesa de Ciencias naturales (*Boletin*), VI, 1, 1907. ⊙

Societas Entomologica, XXI, 24; XXII, 1, 1907. — A.-H. Krausse-Heldrungen : Einiges über die Schidläuse in algemeinen und über sardinische im besonderen. — H. Fruhstorfer : Randbemerkungen zu dem Aufsatze : Neue Parnassiusformen. — C. v. Hormuzaki : Zwei neue Morphocarabusformen aus Rumänien. — W. Neuburger : Eine neue Spannervariation aus Portugal. — H. Fruhstorfer : Neue *Doleschallia* aus Waigiu. — Zwei neue *Hebomoia*. — H. Fruhstorfer : Neu Südamerikanische Satyriden. — Neue *Cirrochroa*-Rassen. — Neu Rhopaloceren aus dem Papna Gebiet. — W. Neuburger : Eine neue Abart von *Lycaena icarus* Rott. ♂. — C. Trings : Eine Aberration von *Las. Quercus* ♂. L. — F. Bandermann : Ergänzungen des Herrn Slevogt betitelt « Sonnenkinder ».

Società zoologica Italiana (*Bollettino*), VII, 7 à 9, 1906. — F. Rostagno : Note entomologiche. Sovra alcune notevoli varietà ed aberrazioni di *Pieris ergane* H.-G., *Lycaena Icarus* Rott., *L. bellaergus*, Rott., *L. argus*, *L. argyrognomon* e *Melitae trivia*.

Société d'Histoire naturelle de Colmar (*Bulletin*), VIII, 1905-1906. — J. Bourgeois : Catalogue des Coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions limitrophes (suite). — G. Schneider : Mitteilungen über interessante Mimikryfälle bei Sumatranischen Spinnen, (1 pl. col.).

Société d'Histoire naturelle des Ardennes (*Bulletin*), IX-XII, 1902-1905. — P. Pigeot : Cynipides gallicoles des Ardennes, (2 art.). — A. Benoit : Note sur deux parasites des arbres : l'*Hylobius abietis* et l'*Hyponomeuta malinella*. — P. Pigeot : Note sur le genre *Trypoxylon* Latr. — Note sur *Andrena nycthemera* Imh. (Hym. Mell.). — A propos de la galle d'*Andricus furunculus* Kief., (Hym. Cyn.). — V. Harlay : Les ravages de la Tordeuse verte du Chêne. — Notes diverses.

Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne (*Bulletin*), LIX, 1906. ⊙

Société de Sciences naturelles de la Haute-Marne (*Bulletin*), IV, 13 et 14, 1907. — C. Frionnet : Note sur *Cirraedia xerampelina* Hb. (= *C. centrago* Haw.). — Chenille des Macrolépidoptères français. — C. Frionnet : Chenilles des Macrolépidoptères de la Haute-Marne.

Société des Sciences naturelles de l'Ouest de la France (*Bulletin*), VI, 4, 1906. ⊙

Société des Sciences naturelles de Saône-et-Loire (*Bulletin*), XIII, 1-2, 1907.

Société Philomathique de Paris (*Bulletin*), VIII, 6, 1906. ⊙

Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève (*Mémoires*), Hors série, s. d. — Œuvres complètes de J.-C. Galissard de Marignac, 2 vol. avec planches.

South African Museum (*Annals*), IV, 7, 1906. ⊙

Stettiner Entomologische Zeitung, LXII, 2, 1906. — A.-F. Nonfried : Coleoptera nova exotica, II. — Dr. Günther Enderlein : Neue Evaniiden, besonders aus Sumatra. — Die indo-australischen Cardiochiliden. — Zwei neue *Coelioxys* aus Sumatra. — 5 neue Arten der Brachonidengattung *Braunsia* aus dem Stettiner Museum. — Prof. H. Kolbe : Die Dynastiden-Gattung *Daemonoplus*. — H. Dohrn : *Diamuna Haenschi* n. sp. — E. Schmidt : Beitrag zur Kenntnis der Cercopiden. Die Gattung *Sialoscarta* Jacobi. — Beitrag zur Kenntnis der Fulgoriden. Die Gattung *Miasa* Distant. — Dr. Günther Enderlein : *Melecta niveipes*, eine neue Biene vom Capland. — Neue Beiträge zur Kenntnis und Klassification der Stephaniden. — Zehn neue aussereuropäischen Copeognathen : Einige notizen zur Kenntnis der Copeognathen Nordamerikas. — G. Breddin : Ueber *Dieuches uniguttatus* Auct. (Rhynchota). — Dr. Günther Enderlein : Neue Honigbienen und Beiträge zur Kenntnis der Verbreitung der Gattung *Apis*. — Dr. H. Dohrn : Orthopterologisches aus dem Stettiner Museum. — E. Schmidt : Beitrag zur Kenntnis der Membraciden. Neue Genera and Species in der Sammlung des Stettiner Museums zur Kenntnis der Fulgoriden-Gattungen *Phrictus* und *Diareusa*.

U. S. Department of Agriculture, Bureau of Entomology (*Bulletin*), n° 63, III à VII, 1907. — W.-E. Hinds : An Ant enemy of the Cotton Weevil, (fig.). — A.-C. Morgan : A predatory Bug reported as an enemy of the Cotton Boll Weevil, (fig.). — E.-C. Pratt : Notes on the Pepper Weevil, (pl. et fig.). — A.-C. Morgan : The Cotton Stalk-borer, (pl.).

U. S. National Museum (*Bulletin*), 39, P. Q., 1902. — ⊙

U. S. National Museum 1° *Report,* 1905 et 1906. — R. Rathbun : Report upon the Condition and Progress of the U. S. National Museum during 1905 and 1906, (2 art.). — 2° *Proceedings,* XXXI, 1907. — H. Richardson : Descriptions of new Isopod Crustaceans of the Family Sphaeromidae, (fig.). — A.-E. Ortmann : Schizopod Crustaceans in the U. S. National Museum, the Families Lophogastridae and Eucopiidae, (2 pl.). — H.-T. Fernald : The Digger Wasps of North America and the West Indies belonging to the Subfamily Chlorioninae, (5 pl. n.). — M. Carry : On the Diurnal Lepidoptera of the Athabaska and Mackenzie Region, British America. — T.-R. Stebbing : A new Costa rican Amphipod, (fig.). — C.-R. Wilson : North American parasitic Copepods belonging to the Family Caligidae, (fig., 6 pl. n.).

University of Cincinnati Record, 1906-1907. ⊙

Wiener Entomologische Zeitung, XXVI, 3, 1907, 2 exempl. — E. Reitter : Nachträge zur Bestimmungstabelle der unechten Pimeliden aus der paläarktischen Fauna. — A. Fleischer : Notiz über *Liodes nitidula* Er. — Dipterologische Notiz. — G. Breddin : Rhynchotographische Beiträge, IV. — F. Hendel : Nomina nova für mehrere Gattungen der acalyptraten Musciden. — K. Flach : Berichtigung über *Stigmodera Yamina.* — E. Reitter : *Planeustomus* (*Compsochilus*) *cephalotes* var. nov. *grandis.* — Dr E. Corti : Eine neue Art der Dipterengattung *Tachydromia* (Meig.) Lw., (fig.). — Dr A. Fleischer : Kritische Studien über *Liodes*-Arten, V. — Die in mährischen Grotten lebend vorgefundenen Coleopteren. — W. Schuster : Biologisches über *Crioceris*-Typen. — E. Reitter : Ein neuer *Microtelus* (Sol.) aus Ægypten. — *Aromia moschata* v. *laevicollis* nov.

Wisconsin natural History Society (*Bulletin*), IV, 1-4, 1906; V, 1, 1907. — A.-L. Melander et C.-T. Brues : The chemical Nature of some Insect Secretions. — V. Fernekes : List of Lepidoptera occurring in Milwaukee Country. — C.-T. Brues : The new Species of Phoridae. — Descriptions from Parasitic Hymenoptera of Cape Colony, (1 pl. n.). — C. Graenicher : A Contribution to our Knowledge of the visual Memory of Bees. — C.-T. Brues : Notes and Descriptions of North American Parasitic Hymenoptera, II, III. — S. Graenicher : On the Habits and Life History of *Leucospis affinis* Say. — C.-T. Brues : New Chalcid-Flies from Cape Colony.

Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie, III, 1 et 2, 1907. — K. Escherisch : Neue Beobachtungen über *Paussus* in Erythrea (fig.). — L. Courvoisier : Ueber Zeichnungs-Aberrationen bei Lycaeniden (fig.). — O. Meixner : Die relative Häufigkeit der Varietäten von *Adalia bipunctata* L. in Postdam (1906), nebst biologischen Bemerkungen über diese und einige andere Coccinelliden. — L. Reh : Insektenfrass an Kakao-Bohnen. — F. Eichelbaum : Die Larven von *Cio festivus* Panz. und von *Emphylus glaber* Gyll, (fig.). — H. Krausse : Copirophagen-Leben auf Sardinien im Herbste. — L. Courvoisier : Ueber Zeichnungs-Aberrationen bei Lycaeniden, (fig.). — O. Meissner : Die relative Häufigkeit der Varietäten von *Adalia bipunctata* L. in Potsdam (1906), nebst biologischen Bemerkungen über diese und einige andere Coccinelliden. — F. Ludwig : Weiteres zur Biologie von *Helleborus foetidus*. — S. Mokrzecki : Naturgeschichte einer Halmeule (*Tapinostola musculosa* Hb.). — F.-A. Cerva : Biologie der *Ellicrinia cordiaria* Hb., (fig.). — A.-H. Krausse : Die Kopf-und Thoraxfortsätze des *Bubas bison* L. — Notes bibliographiques diverses.

A. L.

Le Secrétaire-gérant : P. Chabanaud.